

2.9.4.1 Benutzung von Desifor Plexifree

Zweck

- Reduktion der pathogenen Keime
- Das Auftreten von Infektionen wirkungsvoll verhindern

Regelungen/Vorgehensweise

1. Einsatzbereich von Desifor Plexifree
Desinfektion aller Oberflächen auch im Lebensmittelbereich
2. Flasche vor dem ersten öffnen mit dem Anbruchdatum und dem Verfalldatum versehen.
Muster siehe unten.
Das Gebinde ist nach dem ersten öffnen 12 Monate haltbar.
3. DESIFOR PLEXIFREE auf ein Tuch (Mikrofaser, Einmaltuch, Küchentuch) aufsprühen
Fläche mit dem Tuch abwischen, darauf achten, dass die Lösung flächendeckend aufgetragen wird. Schwer zu desinfizierende Flächen, Arbeitsgeräte können direkt besprüht werden.
Desifor Plexifree nicht großflächig versprühen, um ein Einatmen der Aerosole zu vermeiden
4. Einwirkzeit:
5 Minuten (Coronaviren)
Bei allen Desinfektionsmaßnahmen ist immer die Einwirkzeit strikt einzuhalten! Die aufgebrauchte Desinfektionsmittellösung muss auf den Oberflächen antrocknen, die Flächen dürfen nicht trockengerieben werden. Nach Ablauf der Einwirkzeit ggf. mit klarem Wasser nachwischen (bei direktem Hautkontakt und im Lebensmittelbereich).
5. Bei allen Reinigungs- und Desinfektionsarbeiten müssen Handschuhe getragen werden.

Anbruch:
Verfall:

Freigabe	Version	Gültig ab	Seite
gez. GF	V1	01.11.2020	1 von 1